

Voor het op juiste wijze beoordelen van de aard van het tongetje, de hoogte van de ribben en vooral voor het waarnemen van een enkele of dubbele beharing op het blad, is het gebruik van een loep noodzakelijk.



Naaldvormig	Gevouwen		Gerold			
	Geribd	Ongeribd	Met oren	Behaard →	Zonder oren	
					Onbehaard	
					Sterk geribd	Zwak geribd
<p>1. <u>Schapegras</u> Fo Blad draaddun, gemakkelijk rolbaar tussen de vingers. Bladschede voor <math>\frac{2}{3}</math> of meer open.</p> <p>2. <u>Rood zwenkgras</u> Fr Blad ca. 0,5 mm dik, kantig rolbaar. Randen der (ongereptel) bladscheden bijna geheel vergroeid.</p> <p>3. <u>Hardzwenkgras</u> Gelijkt op een forse vorm van nr. 2, het is echter een ondersoort van nr. 1, want de bladscheden zijn niet vergroeid. Cultuurgras.</p>	<p>1. <u>Engels raaigras</u> Lp Bladachterzijde sterk glimmend. Ribben zeer hoog, met afgeronde top. Tongetje kort, doorschijnend vliezig, meestal samenklappend; Oortjes vaak ontbrekend; indien aanwezig goed onderscheid met nr. 2. Spruit aan de basis meestal rood.</p> <p>2. <u>Kamgras</u> Cy Wat grijsgroen met matige glans. Tongetje bleek, niet vliezig, blijft openstaan. Oortjes ontbreken. Bladbasis vaak samengeknepen. Spruit naar beneden wit, soms wat geelbruin.</p> <p>3. <u>Smele</u> Dc Blad grof driehoekig geribd, zeer ruw bij naar beneden strijken. Bij doorzicht witte lijnen. Tongetje zeer lang, stevig.</p> <p>4. <u>Rood zwenkgras</u> Fr Lijkt door grove ribbing op nr. 3, doch is niet ruw. Geen witte doch lichtgroene lijnen bij doorzicht. Tongetje kort.</p> <p>5. <u>Mannagrass</u> Gf Tongetje zilverwit, smal driehoekig, zeer lang, doch de top vaak dubbel geslagen. Dwarsverbindingen in de bladschede. Fijne, driehoekige ribben. Doffe bladachterzijde.</p> <p>6. <u>Liesgras</u> Gm Tongetje vliezig doorschijnend, accoladevormig. Dwarsverbindingen als nr. 5. Fors en stevig gras met zwak glanzende bladachterzijde. Ribben zeer zwak.</p> <p>7. Op nr. 6 gelijkend, doch</p>	<p>1. <u>Liesgras</u> Gm Kenmerken als in kolom 2, nr. 6, doch ongeribd. <u>Ruidelijke dwarsverbindingen</u> als onderscheid met nr. 2.</p> <p>2. <u>Kropaar</u> D <u>Bladscheden scherp afgeplat</u>. Bladtop spits, iets ruw. Geen dwarsverbindingen.</p> <p>3. <u>Straatgras</u> Pa Klein gras; bladtop stomp, niet ruw. Bladscheden niet scherp afgeplat. Bladachterzijde dof; <u>tongetje lang, wit</u>.</p> <p>4. <u>Veldbeemdgras</u> Pp Blad stevig, vrijwel overal even breed. Van achteren met zwakke glans. <u>Tongetje zeer kort</u>. Bladbasis vaak met enkele wimpers.</p> <p>5. <u>Ruw beemdgras</u> Pt Jong materiaal <u>slap</u> en <u>sterk glanzend</u> aan de achterzijde. <u>Tongetje kort</u> met iets ophopende top. In het voorjaar naar de bloei gaande spruiten met (zeer) lange spitse tong. Bladachterzijde vaak glanzend.</p>	<p>1. <u>Reukgras</u> Ao <u>Lange</u> wimpers op de bladvoet (zie nr. 5). Tongetje lang, doorschijnend, soms violet aangelopen. <u>Cumarinegeur</u> is nogal wisselend.</p> <p>2. <u>Gerstgras</u> Hs Vrij dicht behaard. Beharing op het blad <u>dubbel</u>, doch vaak niet goed ontwikkeld. Oortjes kort. Tongetje <u>kort</u> (zie nr. 6), <u>niet grof gezaagd</u> (zie kolom 5, nr. 5).</p> <p>3. <u>Beemdlangbloem</u> Fp Bladachterzijde met sterke glans. Blad niet stug of hard (zie nr. 5). Tongetje <u>zeer kort, groen</u>.</p> <p>4. <u>Italiaans raaigras</u> Im Als nr. 3, doch tongetje kort, buiten de bladschede komend. Vaak wat slap.</p> <p>5. <u>Rietzwenkgras</u> Fa Donkergroen, hard en stug. Tongetje <u>zeer kort, groen</u>. Bladbasis met <u> korte wimpers</u>.</p> <p>6. <u>Kweek</u> Ely Beharing, indien aanwezig, enkel. Tongetje <u>zeer kort</u>, bleekgroen met <u>zeer fijn</u> getande rand. Oortjes lang en smal.</p>	<p>1. <u>Reukgras</u> Ao Oortjes niet ontwikkeld. Verder als kolom 4, nr. 1.</p> <p>2. <u>Witbol</u> Hl Geheel en kort behaard. Beharing <u>dubbel</u> (langere haren op de ribben, zeer korte op en tussen de ribben). Smalle violette vaatbundels in onderste bladscheden (pyamabroek), zie nr. 5. Tongetje lang, wit, zie nr. 3, grofgezaagd.</p> <p>3. <u>Zachte dravik</u> Em Geheel behaard, doch beharing op het blad <u>enkel</u>. Tongetje doorschijnend, zie nr. 2 en 5. Bladschede gesloten.</p> <p>4. <u>Frans raaigras</u> Arr Tongetje lang, vuilwit en (vlak gedacht) trapeziumvormig met fijn getande bovenrand. Beharing ijl en soms geheel afwezig. Kleur wat grijsgroen.</p> <p>5. <u>Goudhaver</u> Tris Ribbing <u>fijn</u>, doch duidelijk. Beharing dubbel. Tongetje <u>kort</u>, zie nr. 2, wit, zie nr. 3, grofgezaagd.</p> <p>6. <u>Pijpestrootje</u> M In plaats van een vliezige tong een <u>zeer korte haarkrans</u> met enkele lange haren. Blad ook met wat lange haren en naar de basis meestal versmalend.</p>	<p>1. <u>Kruipend struisgras</u> Ac (Zeer) <u>fijne spruiten</u> (door hun dofheid van Pt, zie kolom 3, nr. 5, te onderscheiden). Opvallend lang, wit tongetje. Ribben <u>niet smal driehoekig</u>.</p> <p>2. <u>Geknikte vossestaart</u> Ag Ribben smal driehoekig. Tongetje zeer lang. Blad meestal breder dan 2½ mm.</p>	<p>1. <u>Beemdvossestaart</u> Ap Tongetje kort, vuilwit, in wat oudere toestand spoedig bruin aanlopend. Ribben vrij breed en wat onregelmatig; in het basale deel van het blad een vlak middenbaantje. In vegetatieve staat steeds zonder knopen, zie nr. 4.</p> <p>2. <u>Frans raaigras</u> <del>Arr</del> <u>Flauhaver</u> Hier de onbehaarde vorm van kolom 5, nr. 4.</p> <p>3. <u>Florien</u> As Ribbing duidelijk en regelmatig. Tongetje variabel, bij de normale vorm lang, zie aantekening in kolom 6.</p> <p>4. <u>Gewoon struisgras</u> At Gelijkt op nr. 1, doch de ribbing is fijner en regelmatiger. In zomer vaak met knopen.</p> <p>5. <u>Timothee</u> Phl Mals gras met bladeren, die vaak wat gedraaid zijn en een gegolfde rand hebben. Ribben zwak, afgeplat. Tongetje melkweit, lang, getand. Meestal een paar wimpers aan de bladbasis.</p> <p>6. <u>Rietgras</u> Pha Relatief brede bladeren, die snel in punt uitlopen. Bladeren vlak en nagenoeg ongeribd. Tongetje zeer lang, niet melkweit, doch vliezig. In onderste bladscheden enkele dwarsverbindingen.</p>

Naaldvormige bladeren zijn ook in volgroeide toestand gesloten en smal.

Ongeribd hoeft niet identiek te zijn met volkomen vlak. Meermalen zijn "ongeribde" bladeren zeer zwak geribd. De variabiliteit van het levende materiaal noopt tot een wat milde beoordeling van ribben en tongetje, ook al zijn daarvoor bepaalde maatstaven gesteld.

Dat een blad gevouwen tevoorschijn komt, is in volgroeide toestand nog af te leiden uit de smalle, zich wat donker aftekende goot op de bladbovenzijde. Dit is speciaal van belang bij Engels raaigras (kolom 2), waarvan bij oudere spruiten het jonge blad gerold kan zijn. De onderste bladeren vertonen het genoemde vertoer nog meer of minder duidelijk.

De symbolen achter de namen zijn afkortingen van de Latijnse naam.

De ribbing neemt men het beste waar door het blad op 1/3 van de basis over de vinger te buigen en volgens de raaklijn met de loep te bezien.

Houdt bij het gebruik van de loep beide ogen open en het geheel dicht bij het oog.

Naar het tongetje beoordeeld, zijn er vormen van Florien, die op nr. 1 gelijken (onderscheid ligt in de ribhoogte en/of bladbreedte). Er komen van Florien echter ook vormen voor, die op gewoon struisgras gelijken. Hier blijft het soortsonderscheid in vegetatieve staat twijfelachtig.

Dwarsverbindingen zijn scherp afgetekend en vooral bij Liesgras en Mannagrass, kolom 2, nr. 5 en 6, duidelijk. Bladscheden openbuigen.